




Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE

SETTIMANA N°23



SUSTENIA S.r.l.


Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto

Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it

Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE



SCALA DI DISAGIO



Legenda

- Centri abitati
- aree umide
- Area di progetto: Bologna ovest Reno



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto

Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it


Il valore di disagio è ottenuto sulla base del numero delle zanzare catturate con le trappole ad anidride carbonica e considerando l'aggressività delle singole specie raggruppate in tre categorie: Gruppo a disagio **alto** (*Aedes caspius*, *Aedes vexans*), **medio** (*Culex modestus*, *Anopheles spp.*), **basso** (*Culex pipiens*; *Culiseta spp.*).

Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE

Aumentano le catture delle *Culex pipiens* (Zanzara Comune) nella stazione di Amola. Catture importanti di *Aedes caspius* (zanzara delle risaie) state registrate nella stazione di Palata Pepoli a causa delle piogge abbondanti che hanno allagato le aree naturali. Con l'eccezione delle catture registrate nella stazione di Palata pepoli, ricordiamo che il livelli d'infestazione sono bassi e non giustificano il ricorso a trattamenti adulticidi nelle aree private. Se trasformiamo il valore delle catture in disagio arrecato ai cittadini avremo il seguente istogramma:



Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto
Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it

Anche le infestazioni di Zanzara Tigre sono sotto la soglia di disagio e quindi non si giustifica il ricorso a trattamenti adulticidi

È utile, inoltre, ricordare che i trattamenti adulticidi in questo periodo sono fortemente sconsigliati per la loro azione dannosa nei confronti degli insetti pronubi.

Il valore di disagio è ottenuto sulla base del numero delle zanzare catturate con le trappole ad anidride carbonica e considerando l'aggressività delle singole specie raggruppate in tre categorie: Gruppo a disagio **alto** (*Aedes caspius*, *Aedes vexans*), **medio** (*Culex modestus*, *Anopheles spp.*), **basso** (*Culex pipiens*; *Culiseta spp.*).

INFORMAZIONI SULLA DISINFESTAZIONE

ZANZARA TIGRE

Disinfestazione caditoie pubbliche:

Chiuso il 1° turno di trattamento a San Giovanni in P.to. (marcatura tombini colore rosso), Crevalcore (marcatura tombini colore bianco), Anzola Emilia, e Sala Bolognese. È in corso il 1° turno di trattamento a Calderara di Reno (marcatura tombini colore rosso)

ZANZARE AUTOCTONE

I trattamenti larvicidi nei focolai lineari (fossi e canali) seguiranno il seguente calendario:

Lunedì: San Giovanni in P.to

Martedì: San Matteo della Decima

Giovedì: Crevalcore

Venerdì: Calderara, Anzola Emilia

Sabato: Sala Bolognese



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto
Tel. 051.6871051; Email:info@sustenia.it